



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 4

Enero de 2023

CULTIVOS EXTENSIVOS

Heladas generalizadas en la mayor parte de Aragón y tiempo estable en cuanto a precipitaciones tras las lluvias caídas en las últimas semanas. Factores que favorecen el crecimiento radicular de los cultivos.

CEREAL DE INVIERNO

Fenología

Las lluvias de las últimas semanas y la bajada de las temperaturas han hecho que se vea ralentizado el desarrollo de los cereales. En la mayoría de las zonas de seguimiento, los cereales se encuentran en el estado fenológico de ahijamiento.



Enfermedades y plagas

Los únicas incidencias que se observan en los puntos de seguimiento de cereal son la aparición de síntomas de helmintosporiosis en cebada. Se han registrado valores entorno al 10% de plantas afectadas en algunas parcelas.

Respecto al resto de plagas, no hay incidencias.

Malas hierbas

La gran mayoría de las parcelas de la Red de cereales de invierno no tienen incidencias de malas hierbas. En los casos donde se aplicaron herbicidas de preemergencia aún persiste el efecto de los productos. Si se trata de parcelas en siembra directa, los efectos de estos herbicidas han sido prácticamente nulos o poco claros.

Podemos encontrar cardos (*Cirsium arvense*, entre otros) y verónica (*Veronica* spp.) de manera abundante en parcelas puntuales; vallico y el bromo van en aumento.

En las zonas más altas y frescas encontramos *Vulpia* spp. y especies dicotiledóneas como *Fumaria* spp. pero con las recientes nevadas las parcelas se encuentran impracticables.

OLEAGINOSAS

COLZA

Fenología

Las plantas de colza, pertenecientes a la red, se encuentran en estado de roseta, aumentando el tamaño de las hojas.



Plagas

Ausencia de plagas en las parcelas de colza

LEGUMINOSAS

Fenología

La mayoría de los cultivos de leguminosa se encuentran en estado fenológico de 6 hojas, similar a semanas pasadas, su crecimiento ha sido mínimo debido a las bajas temperaturas de los últimos días.



Cultivo de guisante

Plagas

Ausencia de plagas en las parcelas de guisante, veza y yeros.

Malas hierbas

Se van incorporando nuevas parcelas de seguimiento de leguminosas a la Red y estas se encuentran libres de malas hierbas. Sólo en algún caso la cobertura de malas hierbas va en aumento. Las principales especies que encontramos son gramíneas como Avena loca (*Avena sterilis*), bromo (*Bromus spp.*) y vallico (*Lolium rigidum*).