



Red Fitosanitaria de Aragón
Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 13

MARZO de 2023

OLIVAR


ESTADO FENOLOGICO

Fenología


El estado predominante es **B Brotadura**.

En algunas parcelas en las comarca de Matarraña y Bajo Aragón de Teruel ya aparece el estado **C Formación del racimo floral**.

Y en las comarcas de Borja y Somontano hay algunas con estado fenológico **A yema de invierno**.



A Yema de Invierno



B Brotadura



C Formación racimo floral

BARRENILLO DEL OLIVO (*Phloeotribus scarabaeoides*)

La semana 11 se colocaron los troncos cebo para la captura de adultos de barrenillo, ya se han observado capturas, debido a las altas temperaturas que se están dando.



REPILO (*Fusicladium oleagineum*)

En la primera semana de marzo se realiza el control de Repilo de invierno. Los datos obtenidos de los diferentes controles indican que hay poca incidencia de repilo, tanto visible como inoculado, aunque es recomendable realizar un tratamiento con cobre o derivados para controlar el repilo y otros hongos patógenos que se desarrollan en esta época primaveral.



Repilo visible

En fondos de valle, hondonadas, así como cerca de cauces de río, el repilo se desarrolla mejor, por lo que hay que prestar especial atención en estas zonas.