



## Red Fitosanitaria de Aragón

### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 13

#### VIÑEDO

### 1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

El 77% de los puntos de la RED están entre B2. Yema hinchada. Apertura de escamas Y D. Hojas incipientes. Roseta de puntas de hojas visibles. C. Punta verde. Brotación. Tejido de la primera hoja visible es el estado predominante con el 22% de los controles con esta fenología.

C. Punta verde. Brotación es el estado mayoritario en BORJA BAJA y BORJA MEDIA, mientras que en BORJA BAJA es B1. Lloro. El estado más adelantado de esta D.O. es E1. Hojas extendidas. Primera hoja separada encontrado en un CHARDONNAY de BORJA BAJA.

En CALATAYUD SUR, las viñas se encuentran estado B. Yema hinchada. En CALATAYUD NORTE la fenología va más retrasada, y el 50 % de las viñas están aún en A. Yema de invierno.

En CARIÑENA BAJA se pueden encontrar viñas desde A. Yema de invierno hasta E3. Hojas extendidas. Tres hojas separadas. En CARIÑENA MEDIA el estado predominante es B3. Yema hinchada. Yema de algodón. Aparece el color verde.

En CARIÑENA ALTA el estado más avanzado es D. Hojas incipientes, siendo B2. Yema hinchada. Apertura de escamas el predominante.

Si nos fijamos en las variedades más representadas en REDFARA:

**CABERNET SAUVIGNON:** Está mayoritariamente en B. Yema hinchada, pudiendo encontrar (ambas en CARIÑENA BAJA) A. Yema de invierno y C. Punta verde. Brotación.

**CHADONNAY:** es la variedad más temprana, y todas las parcelas están ya en E. Hojas extendidas, excepto el punto de Lascellas-Lopezano que está en C. Punta verde. Brotación

**GARNACHA:** encontramos viñas entre A. Yema de invierno (CALATAYUD NORTE) y D. Hojas incipientes (BORJA BAJA, CARIÑENA BAJA e Híjar). El estado predominante en el B. Yema hinchada, que se da en CALATAYUD SUR, y las zonas MEDIAS de BORJA y CARIÑENA.

**MAZUELA:** Es una variedad tardía, igual que el Cabernet, y presenta una fenología entre A. Yema de invierno y C. Punta verde. Brotación.

**SYRAH:** Está mayoritariamente en C. Punta verde. Brotación y D. Hojas incipientes.

**TEMPRANILLO:** La fenología mayoritaria es B. Yema hinchada, encontrando también C. Punta verde. Brotación en BORJA BAJA, y D. Hojas incipientes en CARIÑENA MEDIA.



B3. Yema hinchada – Yema de algodón;  
Garnacha en Encinacorba (Cariñena Media).  
28/03/2023



E3. Hojas extendidas. Tres hojas separadas;  
Chardonnay en Alfamén (Cariñena Baja). 28/03/2023

## 2. PRINCIPALES PLAGAS

Durante la pasada semana todos los controles de araña amarilla, erinosis, polilla del racimo y piral se han registrado a cero.

## 3. PRINCIPALES ENFERMEDADES

Durante la pasada semana todos los controles de oídio se han registrado a cero.