



## Red Fitosanitaria de Aragón

### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 15

#### VIÑEDO


### 1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

La fenología estas dos semanas ha avanzado deprisa debido a las altas temperaturas que se dieron en Semana Santa. El 72% de los puntos de la RED están entre E1. Hojas extendidas. Primera hoja separada y F5. Racimos visibles. Cinco hojas separadas. El 30% están en E4. Hojas extendidas. Cuatro hojas separadas. El estado más retrasado es B2. Yema hinchada. Apertura de escamas, y el más avanzado es G8. Racimos separados. Ocho hojas separadas.

En la zona BORJA BAJA la mayoría de las viñas estaban esta semana en E4. Hojas extendidas. Cuatro hojas separadas. En la zona BORJA MEDIA la fenología predominante es E2-E3 (Hojas extendidas. Dos -Tres hojas separadas). En BORJA ALTA es E1-E2 (Hojas extendidas. Una -Dos hojas separadas).

En CALATAYUD SUR, la fenología predominante es C. Punta verde. Brotación. Tejido de la primera hoja visible. En CALATAYUD NORTE la fenología va más retrasada, y el 50 % de las viñas están en B3. Yema hinchada - Yema de algodón. Aparece el color verde.

En CARIÑENA BAJA se pueden encontrar viñas desde B3. Yema hinchada - Yema de algodón. Aparece el color verde hasta G8. Racimos separados. Ocho hojas separadas. En CARIÑENA MEDIA el estado predominante es E4. Hojas extendidas. Cuatro hojas separadas. En CARIÑENA ALTA el estado más avanzado es E4. Cuatro hojas separadas, siendo C. Punta verde. Brotación el predominante.



Si nos fijamos en las variedades más representadas en REDFARA:

**CABERNET SAUVIGNON:** Está entre B3. Aparece el color verde y E3. Hojas extendidas. Tres hojas separadas.

**CHADONNAY:** es la variedad más temprana, y todas las parcelas muestran ya Racimos visibles (desde F5 a G8), excepto el punto de Lascellas-Loponzano que está en E3.

**GARNACHA:** encontramos viñas entre B2. Yema hinchada (CALATAYUD NORTE) y F5. Racimos visibles. Cinco hojas separadas en BORJA BAJA. El estado predominante es el E4, que podemos encontrar en cualquier zona de BORJA y CARIÑENA, en CALATAYUD NORTE, en HIJAR y en MAELLA.

**MAZUELA:** Es una variedad tardía, igual que el Cabernet, pero ha avanzado más. Presenta una fenología entre B3. Yema hinchada – yema algodón, y F5. Racimos visibles.

**SYRAH:** Está mayoritariamente en E4. Hojas extendidas. Cuatro hojas separadas.

**TEMPRANILLO:** La fenología está entre B3. Yema hinchada – yema algodón que encontramos en CALATAYUD NORTE y CARIÑENA MEDIA, y F5. Racimos visibles (también en CARIÑENA MEDIA).



F6. Racimos visibles. Seis hojas separadas; Chardonnay en La Plana de Cosuenda (Cariñena Media). 12/04/2023

## **2. PRINCIPALES PLAGAS**

Durante la pasada semana todos los controles de araña amarilla, eriosis, polilla del racimo y piral se han registrado a cero.

## **3. PRINCIPALES ENFERMEDADES**

Durante la pasada semana todos los controles de oídio y mildiu se han registrado a cero.