Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 18

MAYO de 2023

OLIVAR

ESTADO FENOLÓGICO

Fenología

El estado predominante es **DII, E y FI**

En la mayoría de las comarcas de Aragón ya aparecen olivos en plena floración, las comarcas mas atrasadas son Borja y somontano con **DII**.

Se observa mucha disparidad en el estado fenológico entre parcelas e incluso entre olivos dentro de la misma parcela.

Hay un adelanto de unos 20 días con respecto a un año medio.

DII La corola cambia de color

E Se aprecian los estambres

FI Inicio floración

ABICHADO *(Euzophera pingüis).*

Se están capturando machos en las trampas delta, esta semana y la próxima se darán los máximos de vuelo. En plantaciones jóvenes con presencia de este lepidóptero se aconseja un tratamiento a los 10 -12 días del máximo de vuelo.

BARRENILLO DEL OLIVO (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Se están observando entradas en los troncos cebo, debido a las altas temperaturas se espera que la entrada se termine antes de las fechas previstas en un año medio,(finales de mayo).

Entrada de barrenillo en tronco cebo

BARRENILLO NEGRO (*Hylesinus oleiperda*).

Esta semana en los controles que se realizan de barrenillo negro ya se encuentran *adultos cámara*, estos son ya adultos perfectamente formados a la espera de salir del interior de la madera.

Barrenillo negro saliendo del interior de la madera

PRAYS, POLILLA DEL OLIVO *(Prays oleae) Generación Antofaga*

Durante esta semana y la anterior se han dado los máximos de vuelo en las diferentes comarcas de Aragón. Debido a las altas temperaturas se están dando capturas por

debajo de un año medio. En la generación Antófaga no suele tratarse el Prays por el gran numero de flores que produce el olivo.



Larva de prays en inflorescencia

REPILO *(Fusicladium oleagineum)*

Esta semana se ha realizado el control de Repilo primavera, no se ha observado un incremento en la infectación, debido a la primavera tan seca que hemos tenido, que ha evitado el desarrollo del Repilo.

Repilo inoculado