Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 28

21 de julio de 2023

CULTIVOS HORTÍCOLAS

Los cultivos siguen su desarrollo correctamente en un verano en el que las temperaturas extremadamente altas están siendo puntuales. Destaca la alta incidencia de Heliotis en tomate de transformación en Ejea, y la presencia de vasates en tomate de invernadero en Épila, así como la afección en descenso del escarabajo de la patata y el gusano del alambre en las parcelas de patata de Teruel.

PATATA

La mayoría de parcelas de seguimiento de patata se encuentran en estado fenológico de floración. En la zona de Santa Eulalia está más avanzado el desarrollo y se encuentra en formación de fruto.

Plaga o enfermedad

ALTERNARIA (*Alternaria solani*)

En las patatas de Cella hay un 8% de plantas afectadas por Alternaria, durante la semana pasada había un 5% de plantas afectadas y ha ido ascendiendo ligeramente. En el resto de parcelas de seguimiento de otras zonas no hay incidencia de esta enfermedad.

ESCARABAJO DE LA PATATA (*Leptinotarsa decemlineata*)

El escarabajo de la patata sigue presente en todas las parcelas de seguimiento de Teruel pero con una incidencia controlada. La parcela de Villarquemado es la más afectada, llegando al 60% de plantas ocupadas durante la pasada semana y habiendo descendido al 20% de plantas ocupadas durante la presente semana, con un número muy bajo de puestas, larvas y adultos. Los controles realizados están siendo efectivos y controlando la expansión de esta plaga.

GUSANO DE ALAMBRE (*Agriotes spp.*)

En la zona de Santa Eulalia con capturas de 225 adultos por trampa y semana a finales de mes de junio, sigue siendo la zona con mayor incidencia pero con unos valores de captura en descenso, rondando los 80 adultos por trampa y semana y con solo el 1% de los tubérculos afectados. En el resto de parcelas de seguimiento de Cella y Villarquemado la incidencia de gusano de alambre es muy baja.

GUSANO GRIS (*Agrotis spp.*)

La presencia de gusano gris es muy baja, con 2-4 adultos por trampa y semana.

MILDIU (*Phytophthora infestans*)

La incidencia de mildiu sigue siendo baja con valores máximos del 9% de las plantas afectadas.

PUERRO

El puerro en Ejea se encuentra en estado fenológico de 3 a 6 hojas y no presenta síntomas de plagas ni enfermedades.

MALAS HIERBAS

Las malas hierbas es uno de los principales problemas en el cultivo del puerro, actualmente en las parcelas de seguimiento hay presencia de Cyperus con cobertura de un 4% de la superficie y Xanthium de un 1%.

TOMATE

TOMATE DE TRANSFORMACIÓN

Las plantaciones de tomate se hicieron de forma escalonada en las distintas parcelas de seguimiento debido a la incertidumbre en el momento de la plantación por la cantidad de agua disponible para llevar a cabo el cultivo. Por ello hay parcelas de seguimiento en estado de primera flor abierta de la sexta inflorescencia y parcelas de seguimiento en sexto pomo de frutos desarrollados.

Plaga o enfermedad

HELIOTIS (*Heliothis armigera*)

En la parcela de seguimiento de la zona de Ejea la incidencia de Heliotis es muy alta, con conteos de 850 capturas a la semana. En el resto de parcelas de seguimiento de Alagón y Fuentes de Ebro se han registrado conteos de 35 capturas por trampa y semana.

POLILLA DEL TOMATE (*Tuta absoluta*)

Los conteos de Tuta están siendo muy bajos en las parcelas de seguimiento, con medias de 28 adultos por trampa y semana.

MALAS HIERBAS

La cobertura total de las parcela de seguimiento por malas hierbas es del 2-3% de la superficie total, destacando la presencia de Cyperus y Chenopodium.

TOMATE DE INVERNADERO

El tomate de invernadero se encuentra en estado fenológico de 10% de los frutos alcanzan el color de madurez.

ERIÓFIDOS (Aculops lycopersici)

La presencia de eriófidos en el invernadero de control de tomate para mercado sigue en ascenso, mientras que hace unas semanas la incidencia era del 1-2%, en esta última semana se ha registrado una ocupación del 30% de las plantas.