Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 34

28 de Agosto de 2023

CULTIVOS HORTÍCOLAS

PATATA

Todas las parcelas de seguimiento de patata, tanto en Cella como en Villarquemado y Santa Eulalia, se encuentran en estado fenológico de senescencia.

Plaga o enfermedad

ALTERNARIA (Alternaria solani)

Sigue en ligero aumento el porcentaje de plantas afectadas por Alternaria en la zona de Cella y ya se detectan un 20% de plantas con algún daño. En la zona de Villarquemado empiezan a aparecer también síntomas de enfermedad, pasando del 2 al 4% el porcentaje de plantas con algún daño en la última semana, y se observan hasta el 3%de plantas con daños en Santa Eulalia.

ESCARABAJO DE LA PATATA (*Leptinotarsa decemlineata*)

Tras tres tratamientos contra escarabajo en la zona de Cella, la plaga sigue afectando a la planta de patata de forma considerable. El número de adultos detectados se mantiene en 15 adultos por semana, pero la presencia de larvas se ha

duplicado (ha pasado de 15 a 30) y el porcentaje de plantas afectadas alcanza ya el 50% de la parcela.

En la zona de Villarquemado se mantiene el número de 2 adultos detectados con un 2% de plantas afectadas, y en Santa Eulalia , aunque se mantiene la incidencia del 2% de plantas afectadas, el número de adultos detectados va aumentando con respecto a semanas anteriores.

GUSANO DE ALAMBRE (Agriotes spp.)

Disminuyen los conteos de gusano de alambre en todas las parcelas de seguimiento y sigue sin apreciarse tubérculos afectados. Las capturas registradas en esta última semana han sido de 2 adultos por trampa y semana en Cella y de 17 en Santa Eulalia, manteniéndose a 0 en Villarquemado.

GUSANOS GRISES (*Agrotis spp.*)

En el informe anterior se hablaba de la necesidad de observar la evolución de esta plaga. Afortunadamente, en la última semana, han desaparecido las capturas, por lo que se debe seguir atentos, pero por ahora el gusano gris no plantea ningún problema en el cultivo de patata en ninguna de las zonas controladas.

PUERRO

El cultivo se encuentra en estado fenológico de desarrollo de más de 6 hojas y no presenta síntomas de plagas ni enfermedades. El daño más visible detectado es la gran cantidad de hojas secas aparecidas debido a la fuerte granizada sufrida en la zona de Ejea.

TOMATE

TOMATE DE TRANSFORMACIÓN

El estado fenológico del tomate de transformación es de recolección en la zona de Fuentes, mientras que en la zona de Alagón se encuentran en el estado de 10% de frutos que alcanzan color de madurez y en Ejea entre los estados de 10% y el 80% de

los frutos que alcanzan el color de madurez, dependiendo de la fecha en que fueron plantados.

Plaga o enfermedad

ERIOFIDOS (*Aculops lycopercici*)

Se empiezan a detectar las primeras afecciones por Eriófidos en las parcelas de Ejea y Alagón presentando un 2% de plantas con síntomas.

HELIOTIS (Heliothis armigera)

En todas las zonas controladas se detectan capturas de adultos que van desde los 25 adultos/trampa/día de Alagón a los 100 capturados en Ejea. Aunque han aumentado considerablemente estas capturas, el porcentaje de frutos con daños se mantiene similar a semanas anteriores, 6% de frutos dañados en Alagón y del 4 % al 15% de frutos dañados en la zona de Ejea

POLILLA DEL TOMATE (*Tuta absoluta*)

Los conteos de Tuta se mantienen en los niveles de semanas anteriores, alcanzando valores de entre 35 y 45 adultos por trampa y semana tanto en las parcelas de Ejea como en la de Alagón, detectándose afecciones en ésta última, tanto en hoja (un 4% de plantas) como en fruto (5% plantas con frutos dañados)

TOMATE DE INVERNADERO

El tomate de invernadero se encuentra en estado fenológico de Recolección, y, en estas dos últimas semanas, no presenta afecciones por plagas ni enfermedades. Tampoco se han obtenido capturas en las trampas colocadas.