

## Red Fitosanitaria de Aragón


### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 39

#### VIÑEDO

### 1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

La vendimia ya ha terminado en las zonas más tempranas como Maella, Valdejalón o Híjar, y está prácticamente acabada en Somontano y las zonas baja y media de Cariñena. La parte alta de Borja es en la que la campaña va más retrasada.

En las cotas más altas en las que la fenología estaba más retrasada cuando han caído las lluvias de las últimas semanas, el agua ha retrasado la maduración y mejorado las previsiones de cosecha. En la D.O.P. CARIÑENA el 89% de los puntos de control están vendimiados (hace dos semanas eran el 66%). Tanto en CARIÑENA BAJA como en CARIÑENA MEDIA ya hay puntos en O1. Inicio de caída de hojas. En la D.O.P. BORJA el 50% de los puntos de control están en N1. Maduración y el resto vendimiados; hace 2 semanas solo el 20% estaban vendimiadas). En CALATAYUD SUR el 60% de los puntos están en N1. Maduración, y el 40% vendimiados. En CALATAYUD NORTE el porcentaje de viñas cosechadas es menor y supone el 33%, el doble que hace dos semanas.



Si nos fijamos en las variedades más representadas en REDFARA:

CABERNET SAUVIGNON: el 87% de los puntos ya están vendimiados (N2).

CHARDONNAY: todos los puntos de REDFARA estaban ya vendimiados (N2) hace un mes. Un punto en Cariñena (CARIÑENA MEDIA) está ya en O1. Inicio de caída de hojas.

**GARNACHA:** el 54% de las viñas ya están vendimiadas. En todas las subzonas de BORJA, en CALATAYUD NORTE y CALATAYUD SUR, y en CARIÑENA ALTA quedan puntos de control de Garnacha en N1. Maduración.

**MAZUELA:** el 80% de los puntos están ya se han vendimiado, mientras el resto está en N1. Maduración.

**SYRAH:** excepto un punto en Vera de Moncayo (BORJA ALTA), el resto ya han sido vendimiados. En Paniza (CARIÑENA ALTA) hay un punto en O1. Inicio de caída de hojas en una zona afectada por granizo.

**TEMPRANILLO:** el 18% de los puntos están en N1. Maduración y el 82% ya han sido vendimiados. Hace dos semanas las parcelas cosechadas representaban el 24%.



N1. Maduración. Tempranillo en Senda Del Medio, Aguarón (Cariñena Media). 21/09/2023

## 2. PRINCIPALES PLAGAS

Esta semana no se ha detectado **araña amarilla**.

**Polilla del racimo:** sólo ha habido capturas (0,14 adultos por trampa y día) en el punto de Loma Gorda, en Cervera de la Cañada (CALATAYUD NORTE). No se han registrado ni huevos ni glomérulos.

En cuanto al **mosquito verde** solo en un punto en Ainzón (BORJA MEDIA) ha habido capturas en las trampas cromáticas (1 individuo por trampa), sin que se detectaran individuos en las cepas ni tampoco síntomas.

## 3. PRINCIPALES ENFERMEDADES

Durante la pasada semana se ha registrado **botritis** en el 12,5% de los puntos que aún están sin vendimiar. Las viñas afectadas se concentran en Fuendejalón (BORJA BAJA y BORJA ALTA), Ainzón (BORJA MEDIA), y Vera de Moncayo (BORJA ALTA), y son de las variedades Garnacha y Syrah. Los porcentajes de afección varían entre el 1% y el 5%. Ya se han vendimiado las parcelas más afectadas estas semanas atrás.

**Mildiu:** En casi todas las zonas se han dado las condiciones para que se inicie un nuevo ciclo según el método de Goidanich. Sin embargo, no se han registrado esta semana en ningún control ni hojas ni racimos afectados.

**Oídio:** solo hay síntomas en uno de los puntos, en Cariñena (CARIÑENA MEDIA), en una parcela que arrastra la enfermedad desde hace semanas. Los puntos afectados durante la campaña ya se han vendimiado.